

CONSENTIMIENTO INFORMADO PARA INFILTRACIONES FACIALES

Por lo tanto, comprendo que el tratamiento elegido va a consistir en la implantación de:

Material reabsorbible	Raramente reabsorbible	Tejidos propios (Injerto)
<input type="checkbox"/> Colágeno	<input type="checkbox"/> Metacrilato	<input type="checkbox"/> Grasa / Dermograso
<input type="checkbox"/> Ácido hialurónico	<input type="checkbox"/> Bioalcamid	<input type="checkbox"/> Aponeurosis
<input type="checkbox"/> Otros	<input type="checkbox"/> Gore-tex	<input type="checkbox"/> Piel
	<input type="checkbox"/> Silicona sólida (Prótesis)	<input type="checkbox"/> Hueso / Cartílago

Será colocado mediante:	<input type="checkbox"/> Inyección	<input type="checkbox"/> Incisión/ Despegamiento
-------------------------	------------------------------------	--------------------------------------------------

Para dar volumen o corregir _____

Infiltración de Corticoides para corregir _____

Se me ha explicado que después de la intervención es normal:

- Ligero dolor en la zona tratada.
- Inflamación que disminuye a partir de las 48-72 horas y es mínimo a la semana.
- Equimosis (moratones) que van desapareciendo a partir de los 5 a 7 días y pueden durar hasta 2 semanas.
- Sensación de calor local.
- En el caso de implante de prótesis faciales, en las primeras 48 h., puede aparecer un pequeño sangrado y/o secreción sero-sanguinolenta.

Y que los riesgos posibles más importantes son:

- Los propios de toda intervención quirúrgica: hematoma, seroma, infección, apertura de la herida, alteraciones de la cicatriz o de la piel, etc.
- Pueden aparecer alteraciones neurológicas en la zona tratada: anestesia transitoria o definitiva, dolor, picores u otras sensaciones extrañas (parestias). También es posible que se presenten alteraciones de la movilidad muscular transitorias o definitivas (paresia o parálisis).
- Cuando implantamos material de relleno reabsorbible este puede desaparecer de forma prematura, mientras que si es material duradero pueden aparecer nódulos de fibrosis, eritema (rojez) persistente y extrusión o desplazamiento del material.
- Aunque no es frecuente, con estos productos pueden aparecer reacciones de cuerpo extraño (hipersensibilidad) o incluso reacciones alérgicas.
- En el caso de prótesis sólidas puede haber desplazamiento de las mismas, asimetrías, extrusión, etc.
- Cuando utilizamos tejidos del propio paciente (injertos autólogos) los riesgos anteriores se minimizan, pudiendo producirse la reabsorción parcial o completa del mismo, el desplazamiento o la extrusión. También pueden aparecer fibrosis o durezas, irregularidades, asimetrías, etc.■

Firma:

Aclaración:

Documento:

